

Monitoring lasów HCVF za rok 2015 na terenie Nadleśnictwa Żmigród
(zgodnie z Decyzją Nr 2 Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych we Wrocławiu
z dnia 19.01.2011 roku w sprawie uznania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych
na terenie RDLP we Wrocławiu)

Na terenie Nadleśnictwa Żmigród w 2015 roku pracownicy służby terenowej przeprowadzili monitoring lasów HCVF. Monitoring miał na celu ocenę wpływu działań gospodarczych przeprowadzonych na powierzchniach leśnych objętych kategoryzacją lasów HCVF oraz wpływu czynników abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych na stan zachowania tych lasów w poszczególnych kategoriach ochronności:

1. HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród:
 - HCVF 1.1.1. (las w rezerwatach przyrody) - 298,35 ha
 - HCVF 1.1.2. (las w parkach krajobrazowych) - 12571,58 ha
 - HCVF 1.2. (ostoje zagrożonych i ginących gatunków) – 2717,29 ha
2. HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród:
 - HCVF 2.1 – 13712,86 ha.
3. HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród:
 - HCVF 3.1. (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące) – 2,19 ha
 - HCVF 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy) – 678,08 ha.
4. HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród
 - HCVF 4.1. (las wodochronne) – 7346,10 ha.
5. HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. na terenie Nadleśnictwa Żmigród:
 - HCVF 6. – 24,47 ha

Razem HCVF na terenie Nadleśnictwa Żmigród – 37350,92 ha – powierzchnia wynikająca z zachodzących na siebie obszarów w różnych kategoriach HCVF.

W roku 2015 na terenie Nadleśnictwa Żmigród nie stwierdzono zmian, które spowodowałyby utratę cech lasów HCVF.

Na powierzchni łącznej 1150 ha lasów HCVF stwierdzono negatywny wpływ o charakterze przejściowym spowodowany przede wszystkim przez czynniki takie jak: długotrwała susza, pożary, zalania i podtopienia powierzchni, zamieranie drzewostanów świerkowych.